

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

## STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, avenue Nationale - La Neuville  
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX  
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel :

Edition A ou B : 150 F.

Edition A + B : 285 F.

### ÉDITION GÉNÉRALE - GRANDES CULTURES

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

BULLETIN N° 21 du 6 AOUT 1986

**MAIS** : REGRESSION DES POPULATIONS DE  
PUCERONS MAIS MAINTENIR LA SURVEILLANCE

**LUZERNE** : ATTENTION AUX SITONES.

**POMME DE TERRE** : NE PAS INTERVENIR CONTRE LE MILDIOU.


CE MESSAGE EST CONSULTABLE SUR MINITEL DEPUIS LE 06 AOUT

#### MAIS

##### Pucerons :

**Métopolophium dirhodum** (puceron vert)  
reste l'espèce la plus fréquente. Ce  
puceron est peu nuisible actuellement.


De plus, les dernières chutes de pluie,  
ainsi que les auxiliaires font actuellement  
régresser ses populations.



Longueur du corps 2,25 à 3 mm, couleur  
vert jaunâtre avec une ligne brillante  
et bien visible dans la partie médiane  
du dos.

**Rhopalosiphum padi** (puceron foncé) est  
en progression, mais le niveau d'attaque  
reste faible, sauf dans le secteur de Villenaux  
(10) où 35 à 40 % des pieds sont colonisés et loca-  
lement dans les autres régions.

**Attention** : les populations sont très variables  
d'une parcelle à l'autre.



Longueur du corps 1,5 à 2,3 mm, couleur  
vert olive à brun avec une zone de couleur  
rouille à la base de l'abdomen.

P.1.167

**R. padi est dangereux si 50 %  
des organes reproducteurs sont colonisés  
dans les 10 - 15 jours à venir.**

**. Surveiller les parcelles, surtout celles  
traitées avec un anti-pyrale liquide.**

**. N'intervenir que si le seuil est atteint  
dans ce cas, n'utiliser que Pirimor G ou  
Serk.**

#### **LUZERNE**

##### **Sitones :**

Visiter régulièrement les parcelles  
en bordure de champ de pois.

La luzerne est très sensible aux morsures  
des sitones jusqu'au stade 1ère feuille  
trifoliée.

Tenir compte de la rémanence des traite-  
ments (5 jours) pour réintervenir en cas  
de nouvelle infestation.

#### **POMME de TERRE**

##### **Mildiou :**

Les températures très élevées enregistrées  
au niveau de la végétation (45° C le 3/08/86)  
ont bloqué le mildiou.

Ne pas intervenir.



**Pour profiter des informations par  
MINITEL, appeler directement le  
n° 36.15.91.77 et faire le code  
EDIMK**